

各診療所・クリニックの先生方へ 内視鏡検査に伴う休薬のお願い

いつも大変お世話になっております。当院では、ガイドラインに則って、安心安全で満足いただける内視鏡検査を目指しています。必要に応じて検査中の組織生検を行わせていただきます。

①抗血小板薬・抗凝固薬については、以下のようにお願いします。

- ・単剤内服の場合 → 休薬の必要はありません。生検まで可能な範囲で行います。(ただしワルファリンは検査前1週間以内のPT-INR<3.0である事)
- ・多剤併用の場合 → 観察のみで生検は行いません。事前に患者様が生検をご希望の場合は下表参照の上、問題ないようでしたら休薬や薬剤の置換をお願いします。

		一般名 (商品名)	休薬期間 (検査日は含まない)
抗 血 小 板 薬		アスピリン (バイアスピリン、バファリン、ニトギス) アスピリン+ランソプラゾール (タケルダ)	3-5 日休薬
		塩酸チクロピジン (パナルジン、ニチステート) 硫酸クロピドグレル (プラビックス) アスピリン+硫酸クロピドグレル (コンプラビン) プラスグレル (エフィエント)	5-7 日休薬
		シロスタゾール (プレタール) 塩酸サルボグレラート (アンプラーグ、サルボグレラート) ベラプロストナトリウム (プロサイリン、ドルナー、プロスナー、ベラザス) イコサペント酸エチル (エパデール S、アテロパン、イコペント) リマプロストアルファデックス (プロレナール、オパールモン) トラピジル (ロコルナール、セオアニン) オザクレルナトリウム (カタクロット注射液、キサンボン) 塩酸ジラゼブ (コメリアン、コロンメン) ジピリダモール (ペルサンチン、アンギナール) イブジラスト (ケタス、ピナトス)、オメガ 3 脂肪酸エチル (ロトリガ)	1 日休薬
抗 凝 固 薬		ワルファリン (ワーファリン、ワーリン)	5 日休薬およびヘパリン置換 or 非弁膜症性心房細動なら 5 日間 DOAC へ置換
	DOAC	ダビガトラン (プラザキサ) アピキサバン (エリキューズ) リバーロキサバン (イグザレルト) エドキサバン (リクシアナ)	当日の朝のみ休薬
		ヘパリン	3-6 時間前から休薬

②糖尿病薬、粘膜保護剤以外の処方については、検査当日の朝も中止する必要はございません。


内視鏡治療や外科的治療が必要と考えられる所見を認めた場合、ご本人に説明させていただき、当院での治療を希望されましたら、改めて治療の予定を立てさせていただきます。

高齢者などの場合は、入院での検査も可能です。地域連携室に御問い合わせ下さい。

さくら総合病院へのご案内

医療法人 医仁会
さくら総合病院

お問い合わせ先
地域連携室
受付時間 月～金 AM8:30～PM7:30
土 AM8:30～AM12:00
TEL 0587-95-0015 FAX 0587-95-8624



院内受付へのご案内

